

# Hopfen 2022

Empfehlungen



*Mit Fingerspitzengefühl.*

**Für die Sinne.**

Für feinwürziges Aroma aus jeder Dolde.

# Hopfen 2022

## Empfehlungen



### Alette® WG

- Vollsystemische Verteilung in der ganzen Pflanze
- Gegen Primär- und Sekundärinfektion
- Höchstmengen liegen für USA und Japan vor



### FLINT®

- Sehr gute Dauerwirkung bei vorbeugendem Einsatz
- Gute Mischbarkeit
- Höchstmengen liegen für USA und Japan vor



### Profiler®

- Hervorragende systemische Eigenschaften
- Lange Wirkungsdauer bei hoher Wirkungssicherheit
- Gute Pflanzenverträglichkeit
- Anwendung im Spritzverfahren
- Höchstmengen liegen für USA und Japan vor



FLINT®



*Nur das Beste*  
für den Hopfen!

#### Mehltau von Anfang an sicher im Griff

- Vorbeugende und lange Wirkungsdauer gegen Mehltau ist die Grundlage für eine nachhaltige Bekämpfungsstrategie
- Gute Nachverteilung des Wirkstoffes auf dem Blatt bietet eine hohe Wirkungssicherheit
- Vielseitige Mischbarkeit mit Peronospora-Fungiziden und Insektiziden spart Überfahrten

#### Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Sonderkulturen Vertriebsberater

**Alois Bachmaier**

Mobil (0172) 2 54 02 31  
alois.bachmaier@bayer.com



# Hopfen 2022

## Empfehlungen

Schaderreger	Spritztermine						Bemerkungen
 Peronospora (Primärinfektion)							max. 1 Anwendung/Jahr 1,125 g/Pflanze in 0,2–0,5 l Wasser/Pflanze entsprechen max. 2,25 kg/ha in 400–1000 l Wasser/ha in BBCH 13–15 spritzen Wartezeit: (F) Zulassungserweiterung nach 
							max. 2 Anwendungen/Jahr 1. Behandlung 7 Tage vor dem Anleiten, 2. Behandlung 7 Tage nach dem Anleiten, jeweils in 1000 l Wasser Wartezeit: 14 Tage
 Peronospora (Sekundärinfektion)							insgesamt max. 8 Anwendungen/Jahr im Abstand von 14 Tagen Wartezeit: 14 Tage
 Echter Mehltau							max. 2 Anwendungen/Jahr Frühen Einsatz planen Wartezeit: 14 Tage Zulassungsende: 30.06.2022 Abverkaufsfrist und Aufbrauchfrist beachten
 Blattlaus							max. 1 Anwendung/Jahr Movento® SC 100 sollte bei wüchsiger Witterung <b>vor der Blüte</b> eingesetzt werden. Wartezeit: 14 Tage
<b>Starke Marken</b>    							Wartezeit (F): Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit ist nicht erforderlich.
<b>Entwicklungsstadien</b> BBCH	Austrieb-Blattentwicklung	Entwicklung Seitensprosse-Längenwachstum	Entwicklung Blütenanlagen	Blüte	Doldenentwicklung	Doldenreife	
	0–19	bis 37	bis 55	bis 69	70–79	80–89	

Importtoleranzen	US	Japan	EU
Aliette® WG	✓	✓	✓
FLINT®	✓	✓	✓
Profiler®	✓	✓	✓
Movento® SC 100	✓	✓	✓

Stand: 15.12.2021



**Bayer CropScience  
Deutschland GmbH**

Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim  
Telefon 02173-2076-0  
Telefax 02173-2076-451

[www.agrar.bayer.de](http://www.agrar.bayer.de)

© Januar 2022

BCSD00157626

**Kostenloses AgrarTelefon:**

**0 800 - 220 220 9**

**WhatsApp Beratung:**


**+49 (0) 174-346 564 1**

**Notfallnummer bei  
Vergiftungen von  
Mensch oder Tier**

(24 Std./7 Tage):  
0214-30-20220



**MOVENTO<sup>®</sup>**  
SC 100



*Das einzigartige  
Insektizid im Hopfen.*