

## Den Bestand

so früh wie möglich  
behandeln

Ab  
**BBCH 21**

kann Atlantis® Flex  
auf drainierten Flächen  
eingesetzt werden



Leichte  
**Nachfröste**

beeinflussen die Wirkung  
und Verträglichkeit nicht



Faktor  
**Luftfeuchtigkeit**

verbessert die Aufnahme des Wirkstoffs



Über  
**60% Luftfeuchte**

ist die Anwendung empfohlen

unter  
**50%**

keine Anwendung



Extrem wichtig

**Luftfeuchtigkeit**



Daher bieten sich die

**Abendstunden** zum Spritzen an

ohne Sonneneinstrahlung  
und trockene Luft


Bei extremen  
**Besatzstärken**

oder metabolisch resistentem  
Ackerfuchsschwanz ist  
das **Additiv Biopower**  
zwingend notwendig

Hier empfiehlt sich der Zusatz von AHL  
(max. 30l/ha) oder SSA (max. 10kg/h)

**Additiv Biopower**

Freigabe gilt nur für Atlantis® Flex  
und Atlantis® WG



Nicht unmittelbar  
vor Regen  
anwenden

Auf taunassen  
**Beständen**

ist eine Anwendung möglich  
(sofern keine Spritztropfen abrollen)



Anwendung  
**Mitteltropfig**

Ausnahmen nur, wenn abdriftmindernde  
Technik vorgeschrieben ist

**Bodenbeschaffenheit**

beachten



Klutige  
**Flächen**

im Frühjahr vorab walzen



Dann  
**eine Woche warten**

damit die Samen aus den Kluten keimen

